

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### ЛИЗОБАКТ®

**Регистрационный номер:** П N014179/01

**Торговое название препарата:** Лизобакт®

**МНН или группировочное название:** лизоцим + пиридоксин

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания

**Состав:** одна таблетка для рассасывания содержит:

*Активная субстанция:*

лизоцима гидрохлорид 20,00 мг,

пиридоксина гидрохлорида 10,00 мг.

*Вспомогательные вещества:* лактоза моногидрат, камедь трагакантовая, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин.

#### **Описание:**

Круглые таблетки белого или желтовато-белого цвета с разделительной риской на одной стороне и фаской на обеих сторонах. Возможны включения в виде темных точек.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** [R02AA20]

#### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы, применяется как антисептик, вследствие его прямого воздействия на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы, принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета. Пиридоксин - оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

#### **Показания к применению**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет.

Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Аллергия к куриному белку.

#### **Применение в период беременности и кормления грудью**

Лизобакт® может применяться во время беременности и периода кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяется местно. Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения.

Детям в возрасте 3-7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки, детям в возрасте 7-12 лет - по 1 таблетке 4 раза в сутки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет - по 2 таблетки 3-4 раза в сутки.

Курс лечения 8 дней.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции: ангионевротический отек (отек Квинке), крапивница, бронхоспазм, очень редко - мультиформная эксудативная эритема.

### **Передозировка**

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах значительно превышающих терапевтические и проявляются чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей.

Лечение: обильное питье (форсированный диурез).

### **Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат Лизобакт® усиливает действие антибиотиков, в том числе пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

### **Особые указания**

В случае появления аллергических реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания. По 10 таблеток в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги, по 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Срок годности**

5 лет.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Босналек АО, Босния и Герцеговина, ул. Юкичева 53, 71000 Сараево.

**Претензии потребителей направлять в адрес представительства в РФ:**

119435, Москва, Саввинская наб., д.11,

тел/факс: +7(495) 771-76-32,

[www.bosnalijek-rf.ru](http://www.bosnalijek-rf.ru)